



ارائه شده توسط :

سایت ترجمه فا

مرجع جدیدترین مقالات ترجمه شده

از نشریات معتربر

فعالیت آنتی باکتریال باکتروسین ها: کاربرد آن در غذاها و داروها

چکیده


باکتروسین ها نوعی از پتیدهای آنتی میکروبی سنتز شده ریبوزمی هستند که توسط باکتری ها تولید می شوند و می توانند نژادهایی باکتریایی که ارتباط نزدیکی با باکتری تولید شده ندارند یا ارتباط اندکی دارند را بکشند یا بازدارند، اما با پروتئین های ایمنی ویژه ای که دارند به خود پروتئین ها آسیبی وارد نمی کند. باکتروسین ها یکی از سلاح ها در برابر میکروارگانیسم ها شده اند که این امر با توجه به مشخصات خاص تنوع زیادی از ساختار و عملکرد آن و منبع طبیعی آن و پایداری حرارتی آن می باشد ، بسیاری از بررسی ها اخیر باکتروسین ها را برای کاربرد در فناوری غذایی خالص سازی و شناسایی کرده است که هدف آن این است که زمان نگهداری غذا را افزایش داده و بیماری های پاتوزنی را درمان کرده و درمانی برای سرطان ارائه کند و سلامت انسانی را حفظ کند بنابراین باکتروسین ها ، یک کاندید داروی بالقوه برای آنتی بادی های جایگزین دارند تا باکتری های مقاوم به داروی چندگانه را درمان کنند . نیمه دوم این بررسی بر روی کاربردهای بالقوه آن در علم تغذیه و صنعت داروسازی متمرکز شده است.

كلمات کلیدی :باکتروسین، پروتئین، محصول طبیعی، غذا، درمان سرطان

مقدمه

بسیاری از مواد آنتی باکتریال وجود دارد که توسط حیوانات و گیاهان و حشرات و باکتری ها تولید شده ناد که نمونه هایی از آن ها شامل پروکسید هیدروژن و اسیدهای چرب و اسیدهای ارگانیکو اتانول و آنتی بیوتیک ها و باکتروسین ها می باشند. پتیدهای آنتی میکروبیال (*AMPs*) یا پروتئین هایی که توسط باکتری ها تولید شده اند به عنوان باکتروسین ها دسته بندی شده اند . مواد غذایی کمیاب در محیط باعث می شود که بسیاری از باکتروسین ها برای فضا و منابع رقابت کنند . باکتروسین ها فراوان می باشند و تنوع زیادی دارند و ژن های آنها پتیدهای آنتی میکروبیوتای مربوطه یا نامرتبط را می کشند (نمودار 1) (Cotter 2005) بیشتر 99 درصد باکتری ها می توانند حداقل یک باکتروسین تولید کنند که اکثر آنها

شناسایی نگردیده است (Riley , Wertz 2002) توانایی کشتن باکتروسین ها به عنوان روش موفقی برای حفظ جمعیت و کاهش تعداد رقیبان برای دستیابی به مواد غذایی بیشتر و فضای زندگی بیشتر در محیط در نظر گرفته می شود . بر خلاف اکثر آنتی بیوتیک ها ، که متابولیست های ثانویه می باشند ، باکتروسین ها به طور ریبوزمی سنتز می شوندو نسبت به پروتئوزها حساس می باشند در حالی که به طور کلی برای بدن انسان و محیط اطراف بی ضرر می باشند . جامعه مدرن نسبت به اهمیت سلامت غذا اگاهتر می باشد چون بسیاری از افزودنی های شیمیایی که در غذاها بکار می روند می توانند مواد سمی ایجاد کنند پس بهتر است ادعا کنیم که منابع طبیعی و مزیت های بهداشتی محیط غذایی جمعیت مزیت های بهداشتی برای غذاهای طبیعی بدون افزودنی های شیمیایی رایج تر شده است .



شکل 1

به هر حال اکثر نگه دارنده هایی که از نظر تجاری بیشتر در دسترسند و همچنین آنتی بیوتیک ها توسط سنتز شیمیایی تولید شده اند و مصرف دراز مدت این محصولات می تواند بر سلامت انسان تأثیرگذار باشد چون آنها تعداد باکتری ها در (*gof*) را کاهش می دهند . بعلاوه ، استفاده از آنتی بیوتیک ها یا باقی مانده ها در غذا ، غیر مجاز است . بر خلاف نگه دارنده های شیمیایی و آنتی بیوتیک ها که به طور کلی ایمن و بی خطر در نظر گرفته شده اند (GRAS) ، باکتروسین ها مثل نسین (نیزین) که ایمنی خوبی دارند به عنوان نگه دارنده های غذایی در گیاهان و لبنیات و پنیر و گوشت و محصولات غذایی دیگر عمل می کنند چون

آنها مانع آلووده شدن میکرووارگانیسم ها طی فرآیند تولید می شوند (Deegan 2006) این بازنگری بر روی دسته بندی باکتروسین ها از باکتری های گرم منفی و گرم مثبت تمرکز دارد . کاربرد باکتری های تولید کننده باکتروسین و باکتروسین های منابع طبیعی برای زندگی انسان هم در این گزارش عنوان شده است .

دسته بندی باکتروسین ها

باکتروسین های بدست آمده از باکتری های گرم منفی کولیسین ها کولیسین ها ، پروتئین های آنتی باکتریال هستند که توسط باکتری ها تولید شده اند و می توانند نژادهای باکتری هایی که با گونه های تولید شده ارتباط زیادی دارند را بشناسند تا بتوانند رقیبان محیطی برای دستیابی به فضای زندگی و مواد غذایی را کاهش دهند ، کولیسین ها در سه دامنه اختصاصی سازمان یافته اند، یک دامنه نهشت انتهای آمین (T) که در انتقال سرتاسر غشای بیرونی از طریق پروتئین مفهوم می یابد و یک دامنه اتصال به گیرنده مرکزی (R) که با یک گیرنده غشای بیرونی *Translocator* باکتریایی متصل شده است و یک دامنه سیتوتوسیک انتهای کربوکسیل (C) که فعالیت آنتی باکتریال دارد به منظور اینکه از موقعیت هایی با کولیسین های خود تولید شده جلوگیری می کنیم ، پروتئین های ایمنی اختصاصی به طور همزمانی تولید شده اند تا کولین ها را غیر فعال سازند . (Kleanthos 2010) وقتی یک سطح غشای خارجی باکتریایی ، پروتئین گیرنده تشخیص کولین دارد و سیستم پروتئین *Translocator* دارد ، کولین ها در باکتری ها نهشت شده اند و آن را می کشند و به عنوان نژاد حساس شناسایی شده است .

Table 1 | Classification of colicins by different translocators system: Tol- and Ton-dependent in the *E. coli*.

Colicins	Antibacterial activity	Receptor	Translocators	Molecular weight (Da)	Producing strain	References
GROUP A						
A	Pore-forming	BtuB	OmpF, TolABQR	62989	<i>Citrobacter freudii</i>	Varenne et al., 1981; Morlon et al., 1983
E1	Pore-forming	BtuB	TolC, TolAQ	57279	<i>Escherichia coli</i>	Yamada et al., 1982
K	Pore-forming	Tsx	OmpAF, TolABQR	59611	<i>Escherichia coli</i>	Pils and Braun, 1995a,b,c
N	Pore-forming	OmpF	OmpF, TolAQ	41696	<i>Escherichia coli</i>	Pugsley, 1987
S4	Pore-forming	OmpW	OmpF, TolABQR	54085	<i>Escherichia coli</i>	Pils et al., 1999
U	Pore-forming	OmpA	OmpF, TolABQR	66289	<i>Shigella boydii</i>	Smajs et al., 1997
28b	Pore-forming	OmpA	OmpF, TolABQR	47505	<i>Serratia marcescens</i>	Guasch et al., 1995 GenBank: CAA44310.1
E2	DNase	BtuB	OmpF, TolABQR	61561	<i>Escherichia coli</i> <i>Shigella sonnei</i>	Herschman and Helinski, 1967; Cursino et al., 2002
E7	DNase	BtuB	OmpF, TolABQR	61349	<i>Escherichia coli</i>	Chak et al., 1991; Cursino et al., 2002
E8	DNase	BtuB	OmpF, TolABQR	~70000	<i>Escherichia coli</i>	Toba et al., 1988
E9	DNase	BtuB	OmpF, TolABQR	61587	<i>Escherichia coli</i>	Chak et al., 1991; Macdonald et al., 2004
E3	16S rRNase	BtuB	OmpF, TolABQR	57960	<i>Escherichia coli</i>	Herschman and Helinski, 1967; Cursino et al., 2002
E4	16S rRNase	BtuB	OmpF, TolABQR	ND	<i>Escherichia coli</i>	Males and Stocker, 1982
E6	16S rRNase	BtuB	OmpF, TolABQR	58011	<i>Escherichia coli</i>	Akutsu et al., 1989; Cursino et al., 2002
DF13	16S rRNase	IutA	OmpF, TolAQ	59293	<i>Escherichia coli</i>	van der Elzen et al., 1983
E5	tRNase	BtuB	OmpF, TolABQR	58254	<i>Escherichia coli</i> <i>Shigella sonnei</i>	Males and Stocker, 1982 GenBank: KF925332.1
GROUP B						
B	Pore-forming	FepA	TonB-ExbBD	54742	<i>Escherichia coli</i>	Schramm et al., 1987
la	Pore-forming	Cir	TonB-ExbBD	69429	<i>Escherichia coli</i>	Konisky and Richards, 1970 GenBank: AAA23182.2
Ib	Pore-forming	Cir	TonB-ExbBD	69923	<i>Escherichia coli</i> <i>Shigella sonnei</i>	Konisky and Richards, 1970 GenBank: AAA23188.1
5	Pore-forming	Tsx	TolC, TonB-ExbBD	53137	<i>Escherichia coli</i>	Pils and Braun, 1995a
10	Pore-forming	Tsx	TolC, TonB-ExbBD	53342	<i>Escherichia coli</i>	Pils and Braun, 1995b
D	tRNase	FepA	TonB-ExbBD	74683	<i>Escherichia coli</i>	Roos et al., 1989
M	Peptidoglycanase	FhuA	TonB-ExbBD	29453	<i>Escherichia coli</i>	Kock et al., 1987

ND, not determined.

جدول 1

برای یک کولیسین خاص ، باکتری پروتئین تمیز می گیرند در نژادهای نتیجه گیری اجرا شده است . باکتری ها با یک نهایی سیستم پروتئین *Translocator* به صورت نژادهای مقاوم دسته بندی می شوند ، نژادهای اینمی باکتری های مقاوم و پایدار توسط کولین های اطراف آنها کشته نمی شوند . بسیاری از کولیسین ها وجود دارد و احتمالاً به صورت توالی هستند که بر روی پلاسمما کد بندی شوند در حالی که تعداد اندکی در تجزیه در نظر گرفته می شوند. یک خوشه ژنی نمونه *Collin* مانع کد بندی پروتئین سمی و پروتئین نمونه سازی و پروتئین دامنه و لیزیززنی نشان می دهد (*Goash*) پروتئین لیزیز(*Lysis*) که به پروتئین انتشار باکتروسین ارتباط دارد می تواند با توجه به ظهور کولیسین (*Bep*) می تواند باعث انتشار پروتئین ها از باکتری می شود .

با توجه به انتقال در سراسر سیستم غشای خارجی با گروه (*Corrin*) به دو گروه دسته بندی می شوند سیستم پروتئین A و کل سیستم پروتئین (سیستم *Tol*) برای نفوذ به لایه بیرونی برای مثال کولیسین های E1 و E9 به وجود دارد و کولیسین B می باشد کمتر برای مواد مسدود نپاشد و

سخت است برای مثال باکتروسین ها کولین نباشند بدون ژن لیت موجود بدون اینکه ژن لینزیل را با تجربه انجام دهد (Gascales 2007) چون کولین ها پس از درمان سلول هدف وارد می شوند می توانند نوسانی را نشان می دهد برای مثالکولسین های A و B و EI و Ib و N می باشد .

کاهش در نوع کولبینیس ها : کولین ها دارای $tRNA$ و $RNase$ و $Dnase$ و $16 s$ باشند در هم RNA هضم غیر اختصاصی اتصال به کامپیوتو می باشند .

کولین ها نوع بتیکیلینوناز : این پروتئین ها می توانند پیش ماده فسفریل سینون را هضم کنند که توانایی سنتز ببتیگو کلیدان و مرگ باکتریای را دارد (Cascul 2007)

میکروسین ها

میکروسین ها پپتید های آنتی میکروبی هیدروفوبی سنتز شده ریبوزومی دارای وزن ملکولی اند که ($10 < Da$) می باشند که از پروتئین کولین های وزن ملکولی زیاد KDa 25-80 قابل تمایز می باشند میکروسین ها به عنوان پیش ماده های پپتید ساخته شده اند که ممکن است فرآیند اصلاح پس از همانند سازی در دوره اشباع در یک میکروسین فعال را متحمل شده یا نشده باشند . میکروسین ها غالباً توسط انتروباکتریا گزارش شده اند که PV و پروتئازهایی دارد (Rebuffat 2012) مکانیسم های باکتریایی $RNasc$ و $DNasc$ میکروارگانیسم ها گستردہ است که شامل تشکیل نوع مختصر سازی و نوع نوکلئاز و می باشند .

بازدارنده های سنتز پروتئین همانند سازی DNA می باشند . هیچ ژن میکروکوسین یک ژن $Lysis$ مطابقت ندارد و میکرولوکسین ها خارج از باکتری از طریق سیتم ترشح انتقال نوع $IABC$ انتقال می یابند که از تعدادی از پروتئین ها تشکیل یافته است ، میکروسین ها بر اساس جرم های مولکولی و پیوندهای رقیق شده در ساختار و اطلاعات پس از همانند سازی آنها تقسیم بندی می شوند که شامل دسته IIa مثل میکروسین های L و V و N به سه ژن متفاوت برای سنتز و ارزیابی پپتیدهای کاربردی آن دست یافته اند . میکروارگانیسم های دسته IIb مثل میکروسین های $E 492$ و $M 47$ و $H47$ و دوره خطی یا بدون اصلاحات پس همانند سازی در C انتهایی می باشد .

Table 2 | Classification scheme for gram-negative microcins.

Classification	Characteristics	Microcins	Molecular weight (Da)	Producing strain	References
Class I	Low molecular weight peptides (<5 kDa), post-translationally modified	B17	3094	<i>Escherichia coli</i>	Collin et al., 2013
		C7/C51	1177	<i>Escherichia coli</i>	Severinov et al., 2007
		D93	<1000	<i>Escherichia coli</i>	Martinez and Perez-Diaz, 1986
		J25	2107	<i>Escherichia coli</i>	Wilson et al., 2003
Class II	Larger (5–10 kDa) peptides, with or without post-translational modifications				
class IIa	Required more than one genes to synthesize and assemble functional peptides	L	8884	<i>Escherichia coli</i>	Pons et al., 2004
		V	8741	<i>Escherichia coli</i>	Fath et al., 1994
		N/24	7274	<i>Escherichia coli</i>	Corsini et al., 2010
class IIb	Linear peptides with post-translational modifications or not at C-terminal	E492	7886	<i>Klebsiella pneumoniae</i>	Pons et al., 2002
		M	7284	<i>Escherichia coli</i>	Vassiliadis et al., 2010
		H47	4865	<i>Escherichia coli</i>	Vassiliadis et al., 2010

جدول 2

باکتروسین ها از باکتری های گرم مثبت

بر خلاف کولسین ها از باکتری گرم منفی ، که پروتئین های پلاسمید یا کروموزمی کد بندی شده 80-25 KDa می باشند ، باکتروسین های باکتری گرم منفی مشخصاتی مشابه میکروسین ها دارند . این باکتروسین های کد بندی شده ژن پپتیدهای آنتی میکروبی با وزن ملکولی کم و دارای کمتر از 60 اسید آمینه می باشند. در باکتری گرم مثبت ، باکتری اسید لاکنیک LAB باکتری اصلی است که تنوعی از باکتروسین های دارای اندازه و ساختار و خواص فیزیوشیمیایی و طیف بازدارندگی متفاوتی ایجاد می کند .

با توجه به تنوع زیاد باکتروسین ها ، برخی ارزیابی ها روش های متفاوتی برای دسته بندی باکتروسین های بدست آمده از باکتری های گرم مثبت ارائه می کند (Dimov 2005) باکتروسین های گرم مثبت اساساً به دسته T (لانتیوبیک ها ، پپتیدهای اصلاح شده) و دسته II ، (پپتید های اصلاح نشده و غیر لانتیونی) و دسته III (پروتئین های بزرگ ناپایدار حرارتی) تقسیم بندی می شود (جدول 3) پپتیدهای دسته 1 باکتروسین ها یا لانتیوبیوتیک های اصلاح شده پس از همانند سازی با کمتر از 28 اسید آمینه و پپتیدهای فعال کوچک غشا (KDa < 5) و پپتیدهای گلبولی یا خطی می باشند که دارای لانتونین و بتامتیل لانتوسین و اسید آمینه های هیدرات شده می باشند . باکتروسین های دسته I به لانتیبیوتیک هایی مثل پپتید خطی نیزین و پپتیدهای گلبولی مرسا سیدین و لا بیر بن تو پسپتین ها مثل لا یبر بنسین ها A2 گلبولی و

سالکسیبیوتیک های مثل سابتیلوزین پپتید گلبولی F تقسیم شده اند (*Meind 121*) باکتروسین های دسته II دارای $30-60$ اسیدآمینه اند ($< 10 \text{ Kda}$) که همیشه خواص منحصر به فرد تحمل حرارتی و غیر لاتونین اصلاح نشده و شارژ مثبتی را نشان می دهند.

باکتروسین های دسته دوم توسط *Cotter* به ۵ زیر مجموعه تقسیم شده اند : دسته *Iia* باکتروسینها پپتیدهای فعال لیستریا با یک توالی اسیدآمینه $YGN\text{GVMaa}XC$ در N انتهایی خود می باشد و شامل پروسین *PA-1* می باشد و کارنوباكتروسین *X* می باشد باکتروسین های دسته *IIb* به دو پپتید اصلاح نشده متفاوت برای تشکیل مجموعه *Poration* کاملاً فعال مثل لاکتاسین *F* و *ABP 118* نیاز دارند .
(*Flynn 2002*) باکتروسین های دسته *IIc* باکتروسین های پپتید دایره ای مثل کارنوسیلین *A* و انتروسین *AS-48* می باشد . باکتروسین های دسته *IId* خطی و غیر پدوسین شکل و باکتروسین های تک لیپیدی و شامل اپیدرمسین *N101* لاکتوکسین *A* میباشد. باکتروسین های *11e* اصلاح همانندسازی هیدروفور غیرربیوزولی در ناحیه انتهایی کربوکسیل سرشار از سرین ندارند مثل میکروسین *E492* می باشد. چون میکروسین *E492* از *Klebsila* جدا شده که یک باکتری گرم مثبت نمی باشد باکتروسین های دسته *III* باید در میکروسین های باکتری گرم منفی دسته بندی شوند . باکتروسین های دسته *III* پروتئین های ناپایدار حرارتی دارای وزن مولکولی زیاد ($> 30\text{Kda}$) می باشند. دسته *III* می تواند به دو گروه متمایزی تقسیم شود. باکتروسین های گروه *A* که آنزیم های باکتروولیتی هستند که با *lysis* دیواره سلولی نزادهای حساس مثل انترولیزین *A* را از بین می برنند. (*Nilsen 2003*) باکتروسین های گروه *B* به پروتئین های غیر *Lytic* و *Caseicinno* و *Helveticing* مثل می باشند.

کاربردهای بالقوه باکتروسین ها در علم تغذیه و داروسازی و درمان پزشکی باکتروسین ها اکنون استفاده گسترده ای در علم تغذیه دارند که طول مدت نگهداری غذا را افزایش می دهند که مانع عفونت پاتوژنی بیماری حیوان می شود در صنعت دارویی و جامعه پزشکی برای درمان سرطان های *Malignant* کاربرد دارند (نمودار ۲)

اولین باکتروسین توسط *Gratia* (1925) کشف شد و در سال هاس اخیر از باکتروسین ها بطور موفقی توسط دانشمندان شناسایی شده اند. باکتروسین ها به عنوان یک محصول طبیعی در نظر گرفته می شوند چون آنها پپتیدها یا پروتئین هایی هستند که توسط باکتری موجود در بسیاری از غذاهای تخمیر شده یا نشده از زمان های اولیه ایجاد شده اند. بسیاری از میکروارگانیسم هامثل باکتروسین تولید *L A-B* برای شروع کشت یا کشت همزمان در فرآیند تولید استفاده می شوند که برای افزایش طعم و تاریخ مصرف به کار می روند. در مجموع بسیاری از باکتری های تولید باکتروسین ها از غذاها و مواد خام آنها جدا شده اند (sETANNI 2008)

Table 3 | Classification scheme for gram-positive bacteriocins.

Classification/features	Bacteriocins	Molecular weight (Da)	Producing strain	References
CLASS I				
The bacteriocins are post-translationally modified, linear or globular peptides containing lanthionine, β -methyl lanthionine and dehydrated amino acids	Nisin A Nisin U Nisin Z Mersacidin Labyrinthopeptin A2 subtilosin A	3352 3029 3493 1824 1922 3399	<i>Lactococcus lactis</i> subsp. <i>lactic</i> <i>Streptococcus uberis</i> <i>Lactococcus lactis</i> subsp. <i>lactic</i> <i>Bacillus</i> sp. Y85,54728 <i>Actinomadura</i> sp. <i>Bacillus subtilis</i> 168	Field et al., 2012 Wirawan et al., 2006 Mulders et al., 1991 Chatterjee et al., 1992 Meindl et al., 2010 Babasaki et al., 1985
CLASS II				
Heat stable, unmodified, non-lanthionine-containing bacteriocins, heterogeneous class of small peptides	pediocin PA-1 carnobacteriocin X	4629 3602	<i>Pediococcus acidilactici</i> PAC-1.0 <i>Carnobacterium maltaromaticum</i> C2	Henderson et al., 1992 Tulini et al., 2014
Class IIb (composed of two peptides)	lactacin F ABP-118	4755 4096	<i>Lactobacillus</i> spp. <i>Lactobacillus salivarius</i> subsp. <i>salivarius</i> UCC118	Fremaux et al., 1993 Flynn et al., 2002
Class IIc (circular peptide)	carnocyclin A	5862	<i>Carnobacterium maltaromaticum</i> UAL307	Martin-Visscher et al., 2008
Class IId (linear, non-pediocin like, single-peptide)	enterocin AS-48 epidermicin NI01 lactococcin A	7149 6074 5778	<i>Enterococcus faecalis</i> <i>Staphylococcus epidermidis</i> <i>Lactococcus lactis</i> subsp. <i>Cremoris</i>	Samyn et al., 1994 Sandiford and Upton, 2012 Holo et al., 1991
CLASS III				
Large, heat unstable proteins	Caseicin 80 Enterolisin A Helveticin J	~42000 34501 37511	<i>Lactobacillus casei</i> B80 <i>Enterococcus faecalis</i> LMG 2333 <i>Lactobacillus helveticus</i> 481	Muller and Radler, 1993 Nilsen et al., 2003 Joerger and Klaenhammer, 1990

جدول 3

پروبیوتیک ها

اصطلاح «پروبیوتیک» از لغت یونانی *Arobios* گرفته شده است که به معنی «برای زندگی»، «حمایت از زندگی» می باشد که ابتدا توسط *Still well* (1965) و *Lilly* به کار رفت این پروبیونیک بطورکلی توزان میکروبیوتای روده ای را ارتقاء داده و مزیت های زندگی را افزایش می دهد . سازمان بهداشت جهانی (WHO) پروبیوتیک هارا به این صورت تعریف می کند «میکروارگانیسم های حیات که وقتی در مقادیر کافی به کار می روند مزیت سلامتی برای میزبان خود به همراه دارند (Dobson 2012) مشخصات پروبیوتیک ها باید شامل این مواد باشد گروهی از نژادهای مفید برای حیوان میزبان که می تواند بطور پایداری زنده مانده و فعالیت های متابولیکی را در محیط روده داشته باشد و غیرسمی و غیرپاتوژنی بوده و برای دوره طولانی شرایط سخت و ذخیره پایدار زنده بماند (Fuller(1989) روش های زیادی برای کنترل پاتوژن های روده ای توسط پروبیوتیک ها وجود دارد.

پروبیوتیک ها قابلیت هایی از تولید ماده آنتی میکروبی و *exclusion* (انفجار) رقابتی اتصال پاتوژنی و رقابت برای مواد غذایی و تنظیم سیستم ایمنی را دارا هستند (FAO/WHO 2001) بسیاری از مواد آنتی باکتریایی مثل باکتروسین ها زنجیره کوتاه اسیدهای چرب و پروکسید هیدروژن توسط پروبیوتیک ها ساخته می شوند تا میکروارگانیسم ها یا پاتوژن ها معده روده ای را جلوگیری کنند. (Dobson(2012 در نظر گرفت که باکتروسین هایی یکی از صفات پروبیوتیک ها می باشند اخیراً بسیاری از پروبیوتیک ها در زندگی روزانه به کار می روند که شامل *E.coli* و *LAB* غیرپاتوژنی و باسیلی و مخمراها می شوند. باکتروسین های خالص شده یا باکتروسین هایی که پروبیوتیک هایی را تولید می کنند می توانند تعداد پاتوژنها را کاهش دهند یا ترکیب میکروبیوتای روده در مدل های حیوانی مثل موش و مرغ (جوچه) و خوک را تغییر دهند. Bernbom 2007 توانایی پورسنیترن و نیزین شده از تولید لاکتوکوکوس لاکیز و نژاد لاکتوز لاکتوکوکوس *CHCH2862* را بررسی کرده و بر تریک میکروبیوتای شود. این در موش های مربوط به فلورای انسانی تاثیر گذار بودند و نتیجه گرفته که بیوفید و باکتریوم در موضوع موش هایی که با لاکتوکوکوس لاکتیز تولید سم و یا برخلاف آن به مدت 8 روز افزایش قابل توجهی یافت

در حالی که تعداد انتروکوکسی / استپتروکوکسی در *CeCum* و *duovenvmileum* و کلون کاهش یافت. به هر حال پس از تغذیه نیزین حالص شده این تاثیر مشاهده شده لاكتوکوکوس لاكتیز می تواند از طریق رقابت برای مواد غذایی چسبیدن به محل بر میکروسیوتانی روده تاثیر گذار باشد. بنابراین تاثیر تغییرات در ترکیب میکروبیوتاپی روده به وجود نیزین در لاكتوکوکوس لاكتیز ارتباطی ندارد.

H22 نشان داد که کولیسین *E.Coli* و *Ib* و میکروسین *C7* مشتق شده از *Cursin 2006* این توانایی را دارد که رشد باکتری های پاتوژنی و غیرپاتوژنی را متوقف کند که شامل انتروباکتر و *shigella* و سالموند و *Morganella* و *Klebsido* و *Escherichia*.


در یک مدل موش جرم آزاد *H22* نشان داد که توانایی کاهش جمعیت *Flenneri4* و *Shigella* را تا سطوح غیرقابل شناسایی در موضوع پس از 6 روز مایه کوبی خوراکی نشان می دهد. نتایج نشان داد که *E.Coli* *H22* و نژادهای تولید باکتروین دیگر این پتانسیل را دارد که به عنوان یک پروبیوتیک برای دام و انسان باشد. *Corr 2007* نشان داد که پروبیوتیک منشا انسانی فراورده های *Lacto* *Abp119* برای بازدارندگی عفونت پاتوژن ایجاد شده از *Vce118* در موش را دارد. باکتروسین جهش یافته *Abp118* نژاد *Listeria monorytogen* غذایی موفق نمی شود که از موش در برابر عفونت *Dabp118* حمایت کند. *Riboulet 2012* نشان داد که باکتروسین های *VCC118* یکی از نقاط تغییر ترکیب متوازن در مدل های خوک و موش می باشند. *Millcitt 2008* هم دو باکتروسین تولید *LA₃* یعنی لاكتوکوکوس لاكتیز *Pediococcusacidilactic* و *MM₁₉* و *PA/ACh* هم با لاكتوکوکوس لاكتیز *Pediococcusacidilactic* به ترتیب تولید شدند. که فعالیت قوی آن در برابر ایزولمات *VRE* بالینی را نشان می دهد. نتایج نشان داد که لاكتوکوکوس لاكتیز و *PA-I/ACh* غیرپیوندی تولید جهش یافته پروکوکسی اسیدیلاستیک *MM32A* می کند که توانایی *PediococcusacidilacticMM23* افزایش کل *LAB* و جمعیت نسبی هوازی دارد در حالی که *PediococcusacidilacticMM23*

جمعیت انتروباکتریا در مدفعه موش سالم را کاهش داد. به هر حال پس از تغذیه *MM3* یا *MM19* به مدت 13 روز، جمعیت *VRE* در مدفعه به ترتیب 2/5 و 1/85 کاهش یافت که قابل مقایسه با گروه کنترل بود یک بررسی مشابه نشان داد که پدوسین *Pediococcus acidilactic UL5 PA-1* پروبیوتیک را تولید می کند توانایی بازدارندگی یا منوسبتیون در آزمایشگاه را دارد. به هر حال *Pediococcus* اسید و لاستیک *UL50* را در جمعیت لیتر یا منوسبتیون در روده موش کاهش نداد و از نمونه مدفعه هم شناسایی شد.

با میکروب های دیگر روده می باشد یا از تولید *PA-1* پرومیکروبیتوسط میکروب دیگری در روده جلوگیری می کند. شرایط ایده آل دیگری هم برای استقرار مصنوعی پروبیوتیک با انتقال یک ژن باکتروسین به نژاد *e.COLI* وجود دارد. مزیت های آن بوسیله پروبیوتیک های قدرتمندتری برای انسان با استفاده از روش *e.COIL* های مهندسی ژنتیک به نژاد *e.COIL* ایجاد می شود.

انسانی و بازدارندگی قوی با روش های مهندسی ژنتیک ایجاد می شود. *Gillor* هم از شش پلاسمید تربنده شد باکتروسید متفاوت استفاده کرد که شامل کولین *A* و *E1* و *E2* و *E7* و *K* و *N* بودند تا بتواند به *E.Coli* نژاد *BZB1011* تغییر دهد. موش *CD-1* چهار هفته ای با نژاد کنترل *BZB1011* لقاح یافت یا با یک کلینروژیک *BZB101* لقاح یافت. باکتری مدفعی به مدت 112 روز کنترل شد.

پس از 112 روز لقاح چگالی کلیسینوژنیته *BZB1011* در مدفعه بسیار بالاتر از کنترل *BZB1011* بود. نتایج نشان می دهد که بروز توسيعی در افزایش کلونی سازی *E.coli* در دستگاه گوارش موش مفید است.



شکل 2

تکنولوژی غذایی

به منظور افزایش تاریخ مصرف، آنتی بیوتیک ها یا نگهدارنده های غذایی در نظر گرفته شدند. بهر حال اگر نگهدارنده های تجاری از سنتز شیمیایی و... ایجاد شدند و مصرف درازمدت آن ها تأثیر غالبی بر بدن انسان دارد. به علاوه سوءاستفاده از آنتی بیوتیک ها در صنعت غذایی مجاز می باشد. با توجه به حساسیت باکتروسین ها برای پروتئازها، باکتروسین های بی خطر احتمالاً خورده می مشوند پس پپتیدهای غیر کاربردی کوچک احتمالاً تجزیه می شود پس باکتروسین ها به صورت افزودنی مفید غذایی پس از جذب در سیستم معده روده ای نشان دادند.

باکتروسین ها، افزودنی های غذایی طبیعی مجر با توجه به باکتروسین هستند که وجود باکتری در بسیاری از غذاها از زمان های قدیم مثل پنیر و ماست و گوشت تخمیر شده را نشان می دهد. در تکنولوژی غذایی، لنيزین با *Lactococcus lactis* تولید می شود و اولین پپتید آنتی باکتریال است که در *LAB* یافت می شود. از نظر تجاری باکتروسین به عنوان نگهدارنده غذایی در برابر آلایندگی میکرووارگانیسم ها می باشد.

وارد بازار می شود که مانع رشد لیستر با منوسيتوزن در محصولات گوشت می شود. در بسیاری از محصولات غذایی مثل پنیر سنتی اروپا، شیر در فرآیند ساخت بکار رفته که بلافاصله توسط حیوان آلوده می شود. استرولوکوس باکتروبتوژنی به عنوان یک کشت استارتر یا کشت همزمان می تواند در شروع آن کمک کند.

درمان بیماری های مربوط به پاتوژن

از زمانی که اولین پنی سیلین آنتی بیوتیکی در 1928 توسط الکساندر فلمنگ کشف شد، بسیاری آنتی بادی های بکار رفته در درمان پاتوژن ها را بکار بردن آنتی بیوتیک ها ابتدا با USFDA در 1951 بهتر شد که در موارد عفونت است باکتروسین ها گزارش شده که از پاتوژن های مهم گیاهی یا حیوانی جلوگیری می کند که برای مثال *E.coli* تولید shigs(STEC) و انتروتوسوژیک *E.coli* و اسپکتروکوکوس مقاوم و *Brennessis* می باشد مکانیسم باکتریایی باکتروسین ها در سطح باکتری اتصال گیرنده قرار گرفته و سپس ایجاد می شود که پپسیدهای سمی مضر می باشد. در مجموع باکتروسین ها بندهای کم سمی و حالتی در برابر پروستاز مثل پپتین و تیروپپسین ایجاد می کند.

(Jordi 2001) دریافت که 20 نوع از *E.Coli* می تواند کولیسن را نشان دهد که نوع از سم *shiga* که *E.Coli* را تولید می کند متوقف می سازد (*Hr*, 0157 و 0145 و 0128 و 0111 و 026) این *E.Coli* می تواند باعث اسهال و سندرم اورمیک همولیتی در انسان ها شود و *S₄* و *k* هم تولید می کند که به طور قابل توجهی مانع *E_I* خالص سازی شده و کولین *N* برای فعالسازی موثر در برابر پاتوژن های *F₄* در *E_I* کوسیلینت خالص شد که *K₈₈* و *K₁₈* در آزمایشگاه استفاده کرد که باعث اسهال در موش ها شد. به علاوه پروتئین های *E_I* کولسین خالص شده با مصرف غذاهای خوک های جوان ترکیب شدند. نتایج یک کاهش شیوع اسهال پس از *E.Coli* را توسط *F-18* weaning مثبت نشان داد.

رشد بچه خوک ها بنابراین کاهش یافت که از رژیم غذایی تکمیل شده در جوجه ها ایی رشد که کاهش تعداد *Bacterodes* و انتروباکتریا را در معده جوجه های تغذیه شده بالینی نشان داد. پس از 35 روز رشد، میانگین افزایش وزن بندی نخستین تکمیل یافته 1918 g/bird می باشد که بیشتر از 1729 g از مواردی

غیرنیستی است که کامل شده یا $1763g$ جوجه که سالینومیش خورده بودند بدست آمد. *Stern et al.* 2006 گزارش کرد که باکتروسین جرن ملکولی کم دسته 11 در $OR-7$ از لاکتوباسلولی سالیوسیروس نژاد *Campylobacterjehuni* ایجاد *NRRL* بدست آمده است. این باکترولین توانایی در برابر باکتروسین $OR-7$ هم زمانی پایدار است که بالیزوژیم و لیپاژ و در حرارت 90 درجه یا در دامنه 3 تا 9/1 بدست آمد.

$OR-7$ خالص شده هم در پلی وینیل پیراسیون برای تغذیه مرغ به صورت کپسول درآمده است. جمعیت *C.jehuni* حداقل یک میلیون برابر کاهش یافت که بیش از جوجه هایی است که با غیر از $OR-7$ تغذیه شده بودند. این نتایج نشان می دهد که نیزین و $OR-7$ و باکتروسین های دیگر، این پتانسیل را زمانی نشان می دهند که برای جایگزین کردن آنتی بیوتیک ها در ماکیان و تغذیه حیوانات دیگر به کار می روند.

درمان سرطان

کلی نیم قرن گذشته، سرطان به یک مساله جدی تبدیل شده است و تهدیدی برای سلامت انسان می باشد، طبق اطلاعات جدید وب سایت سازمان بهداشت جهانی 8/2 میلیون نفر در اکثر سرطان می میرند و 12/1 میلیون مورد جدید سرطان در سال 2012 سرتاسر دنیا ایجاد شده است که 60٪ کل موارد جدید دنیا در آفریقا و آسیا و آمریکایی جنوبی و مرکزی ایجاد شده است. از 10 مورد سرطان که بیشترین عامل مرگ و میر ناشی از سرطان محسوب می شود، سرطان شش 2/7٪ و همچنین عامل مرگ و میر 1/5 میلیون مرگ در مورد مرگ و میر در سال 2000 بوده است. در ایالات متحده 1660290 مورد سرطان جدید ایجاد شده است با 580350 مرگ و میر ناشی از سرطان که در سال 2013 رخ داده است و سرطان *Pedestalling* عامل دوم مرگ و میر بوده است که تنها بیماری های قبلی از آن بیشتر می باشد.

در درمان سرطان، برخی محققان بیان کرده اند که باکترولینی ها فعالیتی در برابر سلول های تومور نشان می دهند. با در نظر گرفتن اینکه باکترولین ها به طور طبیعی و مجاز به غذاها استفاده شوند، باکترولینی ها می توانند به عنوان داروی ضد تومور بالقوه ای باشند.

برخی با کتروسینی ها مثل کولبینی های E و A که منافذی تشکیل می دهند. مانع از روزیک خط فیزوبلاست استاندارد داستانی $MR25$ و ۱۱ خط سلول تومور انسانی می شوند.

برعکس فعالیت کولبین U که منافذی تشکیل می دهد و فعالیت $RNNS$ کولبین $E3$ این قابلیت بازدارندگی رشد را ندارد. کولبین D و $E3$ و کولبین منفذساز A می تواند مانع قابلیت سازگاری سلول های کولومسی $P388 mvrine$ شود در حالی که کولبین منفذساز $E1$ و کولبین $E3$ منوبلاست های مرغ تغییر یافته $Vmyb$ نشان می دهند.

کتروسین های تولید کننده با لکترونی داشتند. در مدفوع ۱۶۰ فرد سالم، ۱۰۲ نفر مبا کتروسین های *E.coli* تولید کننده با لکترونی داشتند. در بررسی *Bures (1986)* داشته که نشان داد که کولسین های باکتری ها در روده می تواند یکی از عوامل کاهش کار سینومای کلورکتال انسانی باشد. کولسین ها می تواند به عنوان داروی ضد سرطان پتانسیل متوبطی عمل کند. مکمل های پروبیوتیک های تولید باکتروبین روش دیگری برای جلوگیری از وقوع سرطان می باشد. در بررسی جدیدی *Joo (2012)* دریافت که چنین قابلیت هایی برای جلوگیری از رشد سلولی دارد، کارینوهای سلولی سه سرد کردن $(HNSCC)IVB$ و HSC و $14A$ بانستین در غلظت های ۴۰ و 80 Mglml درمان شدند. پس از ۲۴ ساعت همین، رشته ای شدن DNA یا آپوپتوز افزایش یافته و چرخه سلولی متوقف شد و طول عمر سلولی $HNSCC$ کاهش یافت. سرطان دهانی مدل موش برای بررسی عملکرد ضد $HNSCC$ در ینسیتن استفاده شد. یک مقدار 50 mg/kg نسین. به طور خوراکی هر روز به مدت سه هفته تجویز شد و حجم های تو مورد در موش های درمان شده با نسیتن کاهش قابل توجهی یافت که با موش های کنترل که فقط آب مدریافت کردند قابل مقایسه می باشد. این نتایج نشان می دهد که سنسن یک درمان جدید و بی خطری برای درمان $HNSCC$ ارائه می کند.

نتیجه گیری و رویکردهای آینده

به طور کلی، ژن ها و ژن های ایمنی باکتروسین ها در پلاسمید مشابه یا نواحی مجاور یک کروموزوم کدبندی شده اند. ژن های باکتروسین ها از طریق *Conugation* (ترکیب) می تواند وارد سلول های باکتریایی دیگر شود. بر این اساس، مجاورت یا گشت برای وارد شدن، پاتوژن باکتریایی می تواند ژن ها

ایمنی باکتریایی را بدست آورد. به این ترتیب، در روش های جلوگیری از پاتوژن های غذایی یا محیط، استفاده از پیتید باکتریایی خالص شده یا پروتئین بهتر از استفاده از باکتری برای تولید باکتروسین می باشد. از نظر کنترل بیماری، بسیاری از مقالات، صرفاً توانایی مبارزه پاتوژن های پروبیوتیک تولید شده با یک باکتروسین خاص یا تنها را تا حد موازنه ای این نژادها در دستگاه روده قرار می گیرند. گزارش کرده اند بهر حال انواع پاتوژن ها و جهش یافته های بسیار متفاوتی در طبیعت وجود دارد. استفاده ویژه از یک باکتروسین خاصی نمی تواند تنوعی از پروتئین های باکتروسین را ترکیب کند تا داروهای *cocktail* برای کاربرد در پیشگیری از انواع خاص پاتوژن های انسانی یا حیوانی ایجاد کند که باعث مرگ می شود و میزان نفوذ آن را کاهش می دهد. در کنترل بیماری باکتریوسین می تواند برخی از مسائل پاتوژن های مقاوم به چند دارو مرا حل کند. در سال های اخیر افزایش تعداد پاتوژن های مقام به چند دارو، یک مسئله مهم شده است. یافته ها یا توسعه نسل جدیدی از عوامل آنتی میکروبی اهمیت ویژه ای یافته است.

بسیاری از مواد آنتی باکتریال جدید هم توسط دانشمندان یافت شده که جایگزین آنتی بادی های قدیمی شده اند. بهر حال شناسایی و یافتن مواد بیوتکنولوژی جدید با کار سختی می باشد و استفاده از بیوتکنولوژی برای نفوذ این دو باکتروسین معروف در باکتروسین نبکار می رود که گردش t ثابت سریعی می باشد.

با استفاده از روش ترکیب *PCR* و *ACvnn* ژن انتروسین *CRL35* و ژن های میکروسین *V* را ترتیب کرد تا باکتروسین هایی بدست آورد که *Ent35-mccv* نام دارند. *Ent35-mccv* ظرفیت باکتری کشی در برابر *Listetionmonocytogen* و برخی باکتری های بالینی درونی و *Listaion* گرم مثبت و گرم منفی ایجاد کرد که از نظر بالینی ایزوله شده نمی باشند، این روش می تواند باکتروسین های جدید و چند عملکردی ایجاد شد که از نظر کاربرد و دامنه *GERMICIAT* قوی تر می باشند. در نتیجه می تواند کاربرد گسترده ای در غذاها و پرورش حیوانات و داروها داشته باشد.



این مقاله، از سری مقالات ترجمه شده رایگان سایت ترجمه فا میباشد که با فرمت PDF در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است. در صورت تمایل میتوانید با کلیک بر روی دکمه های زیر از سایر مقالات نیز استفاده نمایید:

✓ لیست مقالات ترجمه شده

✓ لیست مقالات ترجمه شده رایگان

✓ لیست جدیدترین مقالات انگلیسی ISI

سایت ترجمه فا؛ مرجع جدیدترین مقالات ترجمه شده از نشریات معترض خارجی