



ارائه شده توسط :

سایت ترجمه فا

مرجع جدیدترین مقالات ترجمه شده

از نشریات معتربر

## فعالیت عضلات مرکزی در طی تمرينات آويز TRX با و بدون نوارهای درمانی

### کششی در بزرگسالان با کمر درد مزن: پیامد و اهمیت برای توانبخشی

هدف این مطالعه بررسی اثرات نوار های درمانی کششی و تمرين های مختلف آويز TRX بر روی بزرگی فعالیت الکترومیوگرافیک در عضلات مرکزی با کمر درد مزن(LBP) می باشد. هر یک از شرکت کننده ها(21 نفر) در معرض دو وضعیت نوار های درمانی کششی قرار گرفتند: بدون نوار و با نوار، در حالی که چهار تمرين آويز TRX انجام شدند: (1) کشش عضله همسترینگ ، (2) ابداکشن ران، (3) فشار قفسه سینه، و4- ردیف 45 درجه. فعالیت راست شکم عرضی / مورب داخلی (TrAIO)، راست شکمی (RA)، مورب خارجی (EO) و سطحی کمری (LMF) با EMG سطحی ثبت شده و به صورت درصدی از بزرگی EMG در طی انقباض ایزومتریک ماکزیمم عضله های مربوطه بیان شد. ابداکشن ران موجب افزایش LMF EMG TrAIO, RA, EO و سطحی کشش TRX شد. تنها کشش همسترینگ در القای بزرگی بالای LMF (0.001) موثر بود. تفاوت معنی داری در بزرگی EMG بین نوار و بدون نوار مشاهده نشد. ابداکشن ران به طور موثری موجب فعال سازی ماهیچه های شکمی شد در حالی که کشش همسترینگ به طور موثر موجب فعال سازی عضله های پارا اسپینال شد. استفاده از KT موجب ایجاد مزیت های زیادی در بهبود فعال سازی عضله مرکزی در طی تمرين TRX در بزرگ سالان با LBP نشد.

#### ۱- مقدمه

کمر درد مزن (LBP) یکی از علل رایج معلولیت بوده و در واقع موجب افزایش هزینه های بهداشت و درمان می شود. بیش از 80 درصد مردم در طول زندگی خود کمر درد را تجربه می کنند. و از این تعداد 5 درصد مزن است. تمرين پایداری مرکزی به مراتب یکی از رایج ترین راهبرد های توانبخشی برای بهبود کنترل و پایداری پویای ستون فقرات کمری در افراد با کمر درد مزن است. تمرين های پایداری مرکزی بر سطح پایدار اثر کم تری در ایجاد فعالیت عضله در مقایسه با تمرين های پایداری مرکزی با ابزار های ناپایداری نظیر نوار های آويز TRX دارد. اگرچه فعالیت ماهیچه مرکزی هنگام اچرای تمرين با نوار های کششی بالاتر استف بار فشاری نخاع بالا نمی باشد. از این روی تمرين TRX از اهمیت زیادی برای توان بخشی بیماران با LBP مزن برخوردار است.

با این حال در میان طیف وسیعی از تمرین های کششی اویز TRX، یک حرکت مناسب برای افراد مبتلا به LBP مشخص نشده است. تنها یک مطالعه به مقایسه فعالیت عضله در طی چهار تمرین TRX در یک گروه از حوانان و افراد سالم پرداخته است. تیم تحقیقانی نشان داده است که ابداکشن ران موجب بیشترین فعالیت عضله شکم می شود و این در حالی است که کشیدکی همسترینک موجب بیشترین فعالیت عضله نخاعی کمری می شود که با الکترومیوگرافی اندازه گیری می شود. در این مطالعه ما به بررسی فعالیت عضله در طی تمرین های TRX در افراد با LBP مزمن با استفاده از EMG سطحی می پردازیم زیرا قادر به ارزیابی مستقیم فعالیت عضله است. فرض بر این است که تمرین های مختلف TRX موجب فعال سازی عضله های مرکزی در افراد با LBP مزمن می شود.

نوار های درمانی کششی (KT) روش نسبتاً جدیدی است که در مدیریت بالیتی LBP استفاده می شود. این نوار الاستیک، متخلخل و چسبنده بوده و به آسانی بر روی کمر قرار گرفته و مانع از محدود شدن حرکت مفصل در طی تمرین نمی شود. اگرچه اثر نوار های درمانی کششی در مطالعات بالینی بحث انگیز بوده است، برخی از اثرات سودمند نوار های درمانی کششی کزارش شده است ظنی اصلاح ارایش نامناسب احتمالی و بهبود عملکرد عصبی مولکولی. از این روی گفته می شود که نوار های درمانی کششی برای تمرین TRX برای فعال سازی عضله مرکزی لازم است. تا کنون هیچ مطالعه ای به بررسی اثرات حاد نوار های درمانی کششی بر روی فعالیت عضله مرکزی در طی عملکرد تمرین های کششی TRX نپرداخته است.

## 2- مواد و روش ها

این مطالعه ای آزمایشی است که در طی آن هر یک از شرکت کننده ها نحت چهار حرکت و تمرین اویز TRX و دو نوار قرار گرفتند. (1) کشش عضله همسترینگ ، (2) ابداکشن ران، (3) فشار قفسه سینه، و 4- ردیف 45 درجه. فعالیت راست شکم عرضی / مورب داخلی (TrAIO)، راست شکمی (RA)، مورب خارجی (EO) و سطحی کمری LBP). شرکت کننده ها از دانشگاه و از طریق نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. معیار های انتخاب شامل (LMF) مزمن بود که به صورت درد دوره ای مزمندر کمر در طی شش ماه و در افراد بین 18 تا 30 سال اندازه گیری می شود.

معیار های عدم انتخاب شامل اختلال عصبی، ناهنجاری های ساختاری ستون فقرات، اختلالات ستون فقرات ژنتیکی، جراحی قبلی ستون فقرات، صدمات اخیر ستون فقرات و یا محیطی (به عنوان مثال، رگ به رگ شدن رباط)، آلرژی

به KT، و یا مصرف به طور منظم از مسکن، و یا دریافت درمان های فیزیوتراپی فعالبود. این مطالعه توسط کمیته اخلاق دانشگاه ها تایید شد. همه رکت کننده ها به طور داوطلبانه شرکت کردند. به علاوه همه روش های ازمایشی و ارزیابی به هر شرکت کننده قبل از گرفتن رضایت نامه توضیح داده شد. همه روش ها بر طبق بیانیه هلیسنسکی اجرا شدند

اطلاعات جمعیت شناختی با مصاحبه شرکت کننده ها بدست امد. ارتفاع و وزن بدن اندازه گیری شد. شرکت کننده ها در مورد شدت LBP سوال شدند که شامل بدون درد=0 و بیشترین درد=10 بود. پرسش نامه معلولیت رولاند موریس 24 کویه ای برای ارزیابی معلولیت فیزیکی LBP (0 = بدون معلولیت؛ 24 = حداکثر معلولیت) [17] استفاده شد. دستگاه اویز، کیت تمرين اویز خانگی TRX (سان فرانسیسکو) شامل یک کابل پلاستیکی انعطاف پذیر با نور ها و قنداق های پا در هر دو انتهای می بادش که از طریق تکیه گاه به در متصل می شود. روش های استاندارد برای استفاده از دستگاه اویز TRX، برای انجام چهار تمرين TRX در کتابچه رهنما توضیح داده شده اند. این چهار وضعیت برای فعال سازی عضله های مرکزی کزارش شده اند. موقعیت بدن و اثرات مضر در طی تمرين اهای اویز به طور دقیق توسط پرسنل کنترل شد.

الکترود دوقطبی EMG سطحی (سنسرور 1000-SX230، بیومتریک، نیوپورت، UK) برای تشخیص فعالیت ماهیچه در میان چهار(1) کشش عضله همسترینگ ، (2) ابداکشن ران، (3) فشار قفسه سینه، و 4- ردیف 45 درجه. فعالیت راست شکم عرضی / مورب داخلی (TrAIO)، راست شکمی (RA)، مورب خارجی (EO) و سطحی کمری (LMF) با EMG استفاده شد. الکترود عای فعال بر اساس مطالعه مارشال و مورفی 18 شناسایی شدند. به طور کلی موقعیت الکترود های فعال به صورت زیر تعیین شد: TrAIO-2 سانتی متر پایین تر و داخلی در خاصره قدامی ؛ RA-3 سانتی متر نزدیک به ناف و 2 سانتی متر لترال تا خط وسط. EO- درست بالای سایت الکترود، L4-L5-لترال در خط وسط در سطح 14 [19]. نوار چسب ها برای اطمینان از محکم دارای ناف [18]؛ و LMF-لترال در خط وسط در سطح 14 به [19]. بودن الکترود استفاده شدند.

فاصله بین الکترودی الکترود های فعال EMG به صورت 1 سانتی متر در نظر گرفته شد. سیگنال EMG در 1000 هرتز نمونه برداری شده و با ضریب 1000 تقویت شد. یک پارامتر شامل امپدانس ورودی بیش از ده به توان 15 هم بود TrAIO-2 سانتی متر پایین تر و داخلی در خاصره قدامی برتر؛ RA-3 سانتی متر نسبت به ناف و 2 سانتی متر

لترال به خط وسط. EO- درست بالای سایت الکترود TrAIO، در خط مستقیم با ناف [18]؛ و LMF-لترال به خط وسط در سطح L2 به [19] یک دیتا لاگ متصل شدند. دیتا لاگ ها از فیلتر بالا گذر 20 هرتزی برای حذف اثرات DC ناشی از پتانسیل ممبران و فیلتر پایین گذر برای فرکانس های بالاتر از 450 هرتز استفاده کردند. سیگنال های EMG هر عضله مرکزی با استفاده از نرم افزار تحلیل بیومتریک EMG برای نسخه دیتا لاگ پس پردازش شد. مقدار میانگین جذری سیگنال های EMG از هر عضله محاسبه شد. قبل از تمرین اویز TRX، داده های EMG با استفاده از دو ازمایش کشش ایزومتریک در برابر مقاومت دستی برای هر یک از جهار مهایچه جمع اوری شدند. جزیيات EMGrms استفاده از مقاومت دستی در مقاله موگ و همکاران 9 و کسنیل(21) کزارش شده است. مقدار میانگین در طی زمان سه ثانیه ای هر دوره کارازمایی به صورت مقدار MVIC معرف انتخاب شد. مقدار MVIC هر عضله برای نرمال سازی داده ها ثبت شد.

در طی TRX-EMG، شرکت کننده ها بایستی هر یک از چهار موقعیت TRX را به مدت 5 ثانیه حفظ می کردند در حالی که فعالیت EMG عضله های مرکزی ثبت می شد. RMS فعالیت EMG هر عضله مرکزی در طی دوره سه ثانیه محاسبه شد. دو ازمایش با فاصله یک دقیق ای امجام شد و این در برابر مقدار RMS از MVIC هر عضله مرکزی بوده و برایند به صورت درصدی از MVIC تعیین شد. با تکمیل جهار تمرین TRX و ثبت EMG هم زمان نوار کششی درمانی به منطقه کمر اعمال شد. بعد از تثبیت نوار همه روش های اندازه گیری Trx-EMG تکرار شدند. مقادیر MVIC چهار عضله مرکزی محاسبه و برای تحلیل استفاده شد.

تحلیل آماری با استفاده از نرم افزار SPSS LBM انجام شد. سطخ معنی داری 0.05 بود. یک تجزیه واریانس نیز برای مقایسه داده های EMG RMS در شرایط مختلف استفاده شد. در صورتی که فرض کرویت نقض شود ازمنون گرین هاووس کیسر استفاده می شود. تست جفت شده با تعدیل بن فرونی در صورتی اسفاده می شود که همه نتایج معنی دار برای داده ها حاصل شود.

### 3- نتایج


بیست و یک فرد فعال از نظر بدنی با LBP مزمن فیلتر شده و همه آن ها دارای معیار های ارزیابی بودند. در طی تمرین اثرات جانبی نامطلوب گزارش نشد. ویژگی های شرکت کننده ها در جدول 1 نشان داده شده است. در خصوص

فعالیت EMG از TRAIO، اثرات معنی دار موقعیت TRX مشاهده شده است. با افزودن نوار، ابداکشن ران موجب ایجاد بیشترین TrAIO EMG در میان همه موقعیت های TRX شد.

اثر اصلی معنی دار موقعیت TRX در فعالیت EMG از R.A دیده شد.

متغیر	مقدار (میانگین + انحراف معیار)
ویژگی های جمعیت شناختی سن، سال	$21.4 \pm 1.7$
جنسیت، مرد و زن	$11/10$
ارتفاع، متر	$1.7 \pm 0.09$
وزن کیلوگرم	$58.7 \pm 11.2$
شاخص وزن بدن کیلوکرم بر متر مربع	$20.4 \pm 2.3$
ویژگی درد کمر	$3.2 \pm 1.8$
نموده شدت درد VAS	$3.4 \pm 2.2$
امتیاز RDQ-24	$0.20 \pm 0.13$
MVIC EMG	$0.49 \pm 0.25$
TrA/IO, mV	$0.12 \pm 0.11$
RA, mV	$0.36 \pm 0.15$
EO, mV	
LMF, mV	

وقتی که نوار افزوده شد، ابداکشن ران منجر به بیشترین TrAIO EMG در میان همه موقعیت های تست شده TRX شد. اثرات اصلی معنی دار موقعیت TRX در فعالیت RA EMG مشاهده شد. با این حال اثر اصلی شرایط نوار اثر متقابل معنی دار نبود. تحلیل اثرات اصلی اثر معنی دار موقعیت TRX نشان داد که ابداکشن ران دارای بزرگی RA بالاتر از موقعیت های TRX دیگر بود. و این مقدار در طی ابداکشن رام نیز مبرهن بود. برای فعالیت EMG مربوط به EO، اثر اصلی موقعیت TRX معنی دار بود. اثر اصلی شرایط نوار و موقعیت TRX غیر معنی دار بود.



شکل 1: تفاوت ها در : (یک) عرضی شکمی / مورب داخلی (TrAIO)، (ب) عضله راست شکمی (RA)، (ج) مایل خارجی (EO)، و (د) کمری (LMF) EMGrms بین TRX و شرایط نوار . بزرگی EMGrms به صورت درصدی از مقدار ثبت شده در طی MVIC تعیین شد. مقادیر به صورت انحراف معیار + میانگین است. علامت های خطابی SD دور از میانگین است

تحلیل اثرات اصلی موقعیت TRX نشان داد که ابداکشن رام موجب حذف بزرگی EMG EO نسبت به ردیف 45 درجه در شرایط بدون نوار شد. وقتی که نوار افزوده شد، ابداکشن رام موجب افزایش و بزرگی معنی داری در EMG شد. تفاوت معنی داری در بزرگی EO EMG مشاهده نشد. در خصوص فعالیت LMF از EMG موقعیت TRX از اثبات اصلی TRX (45 درجه منجر به بزرگی بیشتر LMF EMG نسبت به همه TRX ها در هر دو شرایط شد. در میان سه موقعیت TRX، ردیف 45 درجه منجر به افزایش بزرگی LMF EMG نسبت به فشار قفسه سینه در هر دو مورد شد. ردیف 45 درجه منجر به

اصادق نبود. تفاوت در بزرگی LMF EMG بین دو شرایط نوار معنی دار نبود.

پخت

این اولین مطالعه است که به بررسی اثر KT و موقعیت های مختلف TRX و اثرات متقابل آن ها بر روی فعالیت غضله مرکزی با LBP مزمن می پردازد. نتایج نشان داده است که ابداکشن ران موجب ایجاد بیشترین سطح فعالیت عضله شکمی در بزرگ سالان با LBP مزمن می شود. این با نتایج مو و همکاران هم خوانی دارد که گزارش کردند که TrAIO و EO در طی ابداکشن ران بسیار بالاتر بود. فعال سازی ماهیچه شکمی بالا را می توان با فعالیت عضله های RA-EO، TRAIO توجیه کرد. در موقعیت TRX، این ماهیچه ها مانع از کشش بیش از حد خاصره به دلیل اثرات جاذبه می شوند. نکته جالب این که فعال سازی ماهیچه LMF در طی ابداکشن ران پایین بود. این بر عکس مطالعاتی بلی بر روی بزرگ سالان بدون درد کمر بود که نشان داد فعال سازی LMF بالا بود. تفاوت ها در این نتایج ناشی از تفاوت ها در گروه های افراد است. در افراد با LBP مزمن، الگوی فعال سازی سینیرژیتیک عضله شکمی موجود است. از این روی شرگت کننده ها با LBP مزمن فعالیت LMF پایین را گزارش کرد. نتایج ما نشان می دهد که کشش همسترینگ بهترین گزینه برای بررسی فعالیت عضله LMF بالا در افراد با LBP مزمن است. این با مطالعه موک و همکاران(9) نیز هم خوانی دارد که گزارش کرده اند فعالیت MLF بیشترین مقدار در طی کشش همسترینگ TrX در شرکت کننده های عاری از lbp است. در طی کشش همسترینگ، اکستنشن خاصره مورد تاکید LMF EMG واقع شده است این موجب افزایش فعال سازی عضله های نخاعی می شود و منحر به افزایش بزرگی می شود

مشابه با نتایج موجود در افراد سالم(9)، نتایج نشان داد که فعالیت عضله در افراد با LBP مزمن در طی تمرین های TRX پایین تنه نسبت به زمان تمرین TRX بالاتر وجود دارد. این نتایج منطقی است زیرا در طی تمرین های بالاتنه، شرکت کننده ها نتایج متفاوتی را نشان دادند. از این روی تقاضا بر روی عضله های مرکزی کم تر بوده است(23-27). به طور ویژه نتایج نشان داد که فشار قفسه سینه، دومین موقعیت بهتر برای ایجاد فعالیت عضله ای بالای EO بوده و ردیف 45 درجه ای بهترین موقعیت برای استخراج فعالیت عضله ای LMF بود. نتایج نشان می دهد که فشار

قفسه سینه جایگزینی برای ابداکشن ران برای فعال سازی ماهیچه سازی شکمی بوده و ردیف 45 درجه ای یک جایگزینی برای کشیدگی همستریتگ برای فعال سازی ماهیچه است.

در خصوص اثرات فوری KT بر روی فعال سازی عضله مرکزی در طی تمرین های مختلف TRX، اثرات معنی دار و غیر معنی دار همراه با اندازه های اثر کم تر نشان داد که نوار در بهبود فعال سازی غضله موثر بوده است. با چندین استثناء، نوار موجب بهبود فعالیت ماهیچه LMF در ردیف 45 درجه ای شده و فعالیت ماهیچه ای در طی فشار قفسه سیه و فعالیت TRAIO در طی ابداکشن ران تعیین شد. مطالعات قبلی نشان داده اند که KT اعمال شده به ماهیچه ها قادر به نرمال ساز یعملکرد ماهیچه از طریق فعال سازی گیرنده مکانیکی است. از این روی روش نواری بر نتایج EMG اثر داشت. مطالعات بیشتری برای تایید اثر نوار الاستیک بر روی فعال سازی ماهیچه در افراد با LBP مزمن لازم است. محدودیت اصلی این مطالعه این است که EMG برای بررسی سطح فعال سازی ماهیچه در طی تمرین TRX استفاده شد. اگرچه یک ویژگی خطی نیروی EMG برای فعالیت عضله گزارش شد، برآورده از تولید نیروی ماهیچه ای ارایه شده است. این از طریق برآورد تقریبی تولید نیروی عضله است. نشخن نیست که ایا تمرین TRX قادر به تقویت غضله های مرکزی است یا خیر. کارازمایی های بالینی تصادفی با اندازه نمونه بزرگ تر و دوره کاربرد KT طولانی تر برای تعیین اثر بخشی تمرین TRX لازم است. محدودیت دیگر عدم کنترل پارامتری در تست دینامیک EMG است. سرعت حرکت در طی تمرین بخ سختی قابل کنترل است به طوری که شرکت کننده ها در طی جمع اوری داده های EMG مطلوب است. از این روی نتایج قابل تفسیر است.

## 5- نتیجه گیری

نتایج این مطالعه نشان داد که ابداکشن ران TRX به طور موثری موجب فعال سازی RA، EO و TrAIO شد در حالی که کشش همستریتک TRX موجب فعال سازی LMF در بزرگ سالان با LBP مزمن شد. کاربرد KT اثر حادی بر روی فعال سازی ماهیچه ای مرکزی در طی ورزش TRX در این کروه خاص از افراد نداشت.



این مقاله، از سری مقالات ترجمه شده رایگان سایت ترجمه فا میباشد که با فرمت PDF در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است. در صورت تمایل میتوانید با کلیک بر روی دکمه های زیر از سایر مقالات نیز استفاده نمایید:

✓ لیست مقالات ترجمه شده

✓ لیست مقالات ترجمه شده رایگان

✓ لیست جدیدترین مقالات انگلیسی ISI

سایت ترجمه فا؛ مرجع جدیدترین مقالات ترجمه شده از نشریات معتبر خارجی